



한일이 만듭니다.
자연을 위해 만듭니다.

Magic Starter Dash



스타터 대시의 활용

- ✓ **분만 직후 회복이 늦는 착유우에게 (특히 초임우)**
하루 1~2kg 탐드레싱으로
탁월한 회복효과를 기대할 수 있습니다.
- ✓ **건유기 BCS가 낮은 소에게**
BCS회복에도 탁월한 효과를 기대 (하루 1~2kg)
- ✓ **40kg이상 고능력우가 걱정 되시면...**
하루 1~2kg를 탐드레싱으로...
- ✓ **육성우가 성장이 더딜 때**
하루 1kg만...

송아지는 농장의 미래입니다.
송아지에 대한 보다 정밀한 관리와
투자는 미래의 큰 수익으로
보답 될 것 입니다



송아지 입붙이기 사료의 필요성

- ◇ 출생직후 반추위 기능 미비.
- ◇ 이유전까지 반추위벽과 반추위내 미생물 활성화 필요.
- ◇ 포유만 할 경우 송아지의 외모는 정상적으로 성장하지만 반추위 발달은 극히 부진하여 이유후 성장 정체가 일어날수 있음.
- ◇ 포유와 조사료만 급여시 반추위의 크기는 커지지만, 기능의 발달은 미비함.
- ◇ 적절한 농후사료를 급여하는 것이, 반추위 기능을 향상 시키는 것이 중요함.



이유 스트레스 최소화*반추위 저작훈련



◇ 송아지 생리의 이해

송아지가 젖병이나 어미소로부터 포유시
식도구가 폐쇄되어 섭취물이 제 4위로 바로 전달됨.

→ **반추위 자극 없음**

사료나 우유를 급이조로 섭취시 제 1위를 통과하여 소화됨.

→ **반추위 자극**



에너지원의 변화(전분→대용유)

반추위 발달강화

고품질 섬유소원 (소화율 높임)

면역물질 (IgY) 보강

고품질 단백질원 사용

우수한 기호성



스타터대시 급여 프로그램(이유전)

일령	우유	스타터	송아지사료	조사료
0~7	초유 급여 4l/일 1일 2회 급여			
8~9	체중의 약 10% 급여	150g		
10~15		200g		
16~20		300g		
21~28		500g		
29~35		800g	700g	자유 채식
36~42		500g	1,000g	
43~49			1,500g	
50~56			1,700g	

출생	7일	42일	90일
초유	우유 + 스타터	어린송아지, 양팜	중송아지

주의 사항

1. 자유채식시 송아지의 식체의 위험이 있으므로, 정량급여 하셔야 합니다.
2. 공급자가 제공하는 급여 프로그램 이외의 기간에 급여시 공급자와 반드시 상의 하신 후 시행하십시오.